

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**Ginseng Aktiv Dragees**

Wirkstoff: 1 überzogene Tablette enthält: 120 mg Trockenextrakt aus Ginsengwurzel (3,3 – 5:1),
Auszugsmittel: Methanol 60% (V/V)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Ginseng Aktiv Dragees jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Die Dauer der Anwendung beträgt in der Regel bis zu drei Monaten. Wegen der fortdauernden Wirkung von Ginseng-Präparaten wird vor einer erneuten Anwendung eine Einnahmepause von einem Monat empfohlen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Ginseng Aktiv Dragees und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ginseng Aktiv Dragees beachten?
3. Wie sind Ginseng Aktiv Dragees einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Ginseng Aktiv Dragees aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND GINSENG AKTIV DRAGEES UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Ginseng Aktiv Dragees sind ein pflanzliches Arzneimittel zur Stärkung.

Anwendungsgebiete:

Ginseng Aktiv Dragees werden angewendet als Tonikum zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl, nachlassender Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON GINSENG AKTIV DRAGEES BEACHTEN?

Ginseng Aktiv Dragees dürfen nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Ginseng, Gelborange S, Ponceau 4R oder einem der sonstigen Bestandteile sind.
- bei behandlungspflichtiger Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ginseng Aktiv Dragees ist erforderlich:

- Wenn Schwächegefühl, Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen länger andauern, sollte - wie bei allen unklaren Beschwerden - ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
- Wenn Sie das Arzneimittel einnehmen wollen, während Sie gleichzeitig blutgerinnungshemmende Medikamente vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) einnehmen, sprechen Sie vorab mit Ihrem Arzt. In diesem Fall sollten engmaschige Kontrollen der Gerinnewerte im Blut bis zu 14 Tage nach Absetzen die-

ser Arzneimittels erfolgen, um die Dosis der blutgerinnungshemmenden Medikamente anpassen zu können. Beachten Sie bitte auch die folgenden Angaben.

Bei Einnahme von Ginseng Aktiv Dragees mit anderen Arzneimitteln:

- Bei gleichzeitiger Einnahme dieses Arzneimittels mit blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) kann deren Wirkung abgeschwächt werden.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für die genannten Arzneimittel gelten können, wenn deren Anwendung wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

- Ginsengzubereitungen können den Blutzuckerspiegel beeinflussen.

- Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zur Behandlung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sind möglich, wurden jedoch bisher nicht untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Ginseng Aktiv Dragees zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken: sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Dieses Arzneimittel sollte in der Schwangerschaft und während der Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen.

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen: Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Ginseng Aktiv Dragees:

Dieses Arzneimittel enthält Glucose, Lactose und Saccharose (Saccharose). Bitte nehmen Sie Ginseng Aktiv Dra-

gees daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE SIND GINSENG AKTIV DRAGEES EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Ginseng Aktiv Dragees immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Für Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahre: 3 mal täglich 1 überzogene Tablette.

Die überzogene Tablette nicht im Liegen einnehmen. Nehmen Sie die überzogene Tablette bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Dauer der Anwendung:

In der Regel bis zu drei Monaten. Wegen der fortdauernden Wirkung von Ginseng-Präparaten wird vor einer erneuten Anwendung eine Einnahmepause von einem Monat empfohlen.

Beachten Sie bitte auch die ergänzenden Angaben unter Punkt 2 „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ginseng Aktiv Dragees ist erforderlich“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Ginseng Aktiv Dragees zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Ginseng Aktiv Dragees eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 1 oder 2 überzogene Tabletten) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, können als Nebenwirkungen bekannte Symptome Magenschmerzen, Übelkeit und Durchfall verstärkt auftreten.

In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Ginseng Aktiv Dragees vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme bzw. Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Ginseng Aktiv Dragees abbrechen:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Im Zweifelsfalle befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Ginseng Aktiv Dragees Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

– Bei empfindlichen Personen können Übelkeit, Magenbeschwerden und leichter Durchfall auftreten.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen informieren Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND GINSENG AKTIV DRAGEES AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C lagern

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Ginseng Aktiv Dragees enthalten:

Der Wirkstoff ist:

Ginsengwurzel-Trockenextrakt

1 überzogene Tablette enthält:

120 mg Trockenextrakt aus Ginsengwurzel in einem Verhältnis von Droge zu Extrakt wie 3,3 – 5:1. Das Ausgangsmittel ist Methanol 60% (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind:

hochdisperses Siliciumdioxid, Maisstärke, Povidon, Cellulosepulver, Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat, Macrogol, Talkum, Sucrose (Saccharose), Arabisches Gummi, Titandioxid (E 171), Calciumcarbonat E 170, weißer Ton, Glucose-Sirup, Gelborange S (E 110), Ponceau 4R (E 124), Montanglycolwachs.

Erhältliche Packungsgrößen:

Originalpackung mit 60 überzogenen Tabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer:

ABTEI Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, D-37696 Marienmünster

Hersteller:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet:

Januar 2006



ABTEI Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, D-37696 Marienmünster