



Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen!

für Kinder

Magen-Darm-Entspannungs-Suspension

Wirkstoff: Simeticon

Zusammensetzung

1 ml enthält 41,0 mg Simeticon

Sonstige Bestandteile:

gereinigtes Wasser, Tagat, Magnesium-Aluminium-silikat, Hydroxyethylcellulose, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Sorbinsäure, Natriumcycamat, Saccharin, Macrogol, Aroma Typ Himbeer, Aroma Typ Vanille, Citronensäure

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 50 ml Suspension

Hersteller:

HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert Str. 1
D-23562 Lübeck

Ein Produkt der Abtei Pharma Vertriebs GmbH,
Abtei 1, D-37696 Marienmünster

Information:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl

Zweckbestimmung

Entschäumer

Zur symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden, z. B. Völlegefühl, Aufstoßen, Blähungen.

Hinweis: Bei neu auftretenden und / oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten diese medizinisch abgeklärt werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Magen-Darm Entspannungs-Suspension nicht anwenden?

Nicht angewendet werden sollte die Magen-Darm-Entspannungs-Suspension bei einer bekannten Hypersensitivität gegen Simeticon oder einen anderen Bestandteil von Magen-Darm Entspannungs-Suspension.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Magen-Darm Entspannungs-Suspension während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei neu auftretenden und / oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine u. U. zugrunde liegende, behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Mittel beeinflussen die Wirkung von Magen-Darm Entspannungs-Suspension?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Magen-Darm Entspannungs-Suspension nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Magen-Darm Entspannungs-Suspension sonst nicht richtig wirken kann! Die Dosierung erfolgt mit dem beiliegenden Messlöffel.

Säuglinge und Flaschenkinder:

Jedem Fläschchen wird 1 ml Magen-Darm Entspannungs-Suspension beigegeben. Magen-Darm Entspannungs-Suspension mischt sich problemlos mit anderen Flüssigkeiten, z. B. mit Milch.

Bei Säuglingen, die gestillt werden, kann Magen-Darm Entspannungs-Suspension auch jeweils vor dem Stillen mit einem kleinen Löffel verabreicht werden.

823811 17/08





Kleinkinder im Alter von 1 bis 6 Jahren:

1 bis 2 ml 3 bis 4 mal täglich.

Bei Bedarf können auch vor dem Schlafengehen noch 1 ml eingenommen werden.

Schulkinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, Jugendliche und Erwachsene:

1 bis 2 ml 3 bis 5 mal täglich.

Magen-Darm Entspannungs-Suspension vor Gebrauch kräftig schütteln!

Wie und wann sollten Sie Magen-Darm Entspannungs-Suspension einnehmen?

Magen-Darm Entspannungs-Suspension wird zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen eingenommen.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden.

Magen-Darm Entspannungs-Suspension kann, falls erforderlich, auch über längere Zeit eingenommen werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Der Wirkstoff von Magen-Darm Entspannungs-Suspension bringt den Schaum im Magen-Darm-Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und ist chemisch und biologisch vollkommen unwirksam. Deshalb ist eine Vergiftung praktisch ausgeschlossen. Auch große Mengen Magen-Darm Entspannungs-Suspension werden problemlos vertragen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Magen-Darm Entspannungs-Suspension eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Führen Sie die Einnahme fort, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

In diesem Falle kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Magen-Darm Entspannungs-Suspension auftreten?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Magen-Darm Entspannungs-Suspension wurden bisher nicht beobachtet. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Medizinproduktes

Das Verfallsdatum des Medizinproduktes ist auf dem Etikett und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Medizinprodukt nicht mehr nach diesem Datum!


Wie ist die Magen-Darm Entspannungs-Suspension aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.


Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.


CE 0482

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:

 Vor Gebrauch lesen

 obere Temperaturgrenze

 Chargennummer

 Verwendbar bis

Stand der Information

März 2008

 Kinder-Info-Telefon: 0180 / 3 475 475
Mo-Fr: 8 bis 17 Uhr (0,09 € / Minute*)

* aus dem deutschen Festnetz. Für Anrufe aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten.

ABTEI Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, D-37696 Marienmünster
Information: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, D-77815 Bühl