

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Antiflat-Kautabletten

Wirkstoff: Simethicon

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Antiflat-Kautabletten jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach wenigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Antiflat-Kautabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Antiflat-Kautabletten beachten?
3. Wie sind Antiflat-Kautabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Antiflat-Kautabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND Antiflat-Kautabletten UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Gestörte Verdauungsvorgänge, fehlerhafte Ernährung, blähende Speisen sowie das Schlucken von Luft führen oft zu Blähungen. Besonders bei Säuglingen und Kleinkindern kommt es oft durch hastiges Trinken zu Blähungen. Dadurch wird die normale Aufnahme der Gase durch die Darmwand erschwert oder sogar völlig unmöglich gemacht. Die Gasansammlungen liegen im Magen-Darm-Trakt dann als träger, kleinblasiger Schaum vor. Der Wirkstoff von Antiflat-Kautabletten bringt den Schaum zum Zerfallen. Dadurch können die Darmgase auf natürlichem Wege abgehen. Der Wirkstoff selbst wird nicht in den Blutkreislauf aufgenommen, sondern unverändert ausgeschieden.

Die Einnahme von Antiflat führt normalerweise zu einer raschen Beschwerdefreiheit mit dem Gefühl der Erleichterung und beseitigt das Spannungsgefühl des geblähten Bauches. Auch Herzbeklemmungen, die durch eine Verdrängung des Zwerchfells verursacht werden (das so genannte Roemheld-Syndrom), klingen nach kurzer Zeit ab.

Antiflat-Kautabletten werden angewendet

- bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus) mit Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl und Spannungsgefühl im Oberbauch.
- bei verstärkter Gasbildung nach Operationen sowie Roemheld-Syndrom.
- zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten (Ultraschalluntersuchungen, Röntgen).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Antiflat-Kautabletten BEACHTEN?

Antiflat-Kautabletten dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Simethicon oder einen der sonstigen Bestandteile von Antiflat-Kautabletten sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Antiflat-Kautabletten ist erforderlich

- bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt; In diesem Fall ist eine ärztliche Beratung nötig.

Bei Einnahme von Antiflat-Kautabletten mit anderen Arzneimitteln

Obwohl bisher keine Wechselwirkungen bekannt sind, sind auf Grund der oberflächenaktiven Eigenschaften der Wirksubstanz Einflüsse auf die Resorption anderer Arzneisubstanzen nicht auszuschließen.

Bei Einnahme von Antiflat-Kautabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Ein Einfluss von Nahrungsmitteln oder Getränken auf die Wirkung von Antiflat-Kautabletten ist nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da Simethicon nicht vom Körper aufgenommen wird, können Antiflat-Tropfen während der Schwangerschaft und Stillzeit verabreicht werden.

Allerdings sollte während der Schwangerschaft die Anwendungsdauer 3 Tage nicht überschreiten und danach ein therapiefreies Intervall von 14 Tagen eingehalten werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Antiflat-Kautabletten

Antiflat-Kautabletten enthalten Zucker (Saccharose und Glucose). Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Vorsicht bei Diabetikern: Zuckergehalt von ca. 0,25 g Zucker (Saccharose) und 0,3 g Traubenzucker (Glucose) pro Tablette berücksichtigen; entspricht ca. 0,05 BE.

3. WIE SIND Antiflat-Kautabletten EINZUNEHMEN?

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten.

Für die Behandlung von Blähungen und Völlegefühl wird Folgendes empfohlen:

- 1 – 2 Tabletten werden 3mal täglich zu oder nach den Mahlzeiten eingenommen. Bei Bedarf können auch vor dem Schlafengehen noch 1 – 2 Tabletten eingenommen werden.
- Zur Vorbereitung bildgebender diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich werden am Tag vor der Untersuchung von Erwachsenen nach jeder Mahlzeit und am Morgen des Untersuchungstages 2 – 3 Tabletten eingenommen.

Bei Kleinkindern ist die Dosis zu halbieren.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art und Verlauf der Beschwerden. Antiflat-Kautabletten können, falls notwendig, über längere Zeit eingenommen werden.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist eine ärztliche Beratung nötig.

Art der Anwendung

Achten Sie darauf, dass Sie die Tabletten vor dem Schlucken zerkauen.

Wenn Sie eine größere Menge von Antiflat-Kautabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine größere Menge Antiflat-Kautabletten eingenommen haben oder ein Kind eine größere Menge Antiflat-Kautabletten geschluckt hat.

Wenn Sie die Einnahme von Antiflat-Kautabletten vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern fahren Sie wie gewohnt mit der nächsten Einnahme fort.

Wenn Sie die Einnahme von Antiflat-Kautabletten abbrechen wollen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie die Behandlung mit Antiflat-Kautabletten abbrechen möchten.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt.

Sollten doch wider Erwarten Nebenwirkungen auftreten, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

5. WIE SIND Antiflat-Kautabletten AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25° C lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blisterstreifen/dem Tablettenbehältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Für Tabletten im 300 Stück-Tablettenbehältnis: innerhalb 52 Wochen nach dem ersten Öffnen verwenden.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Antiflat-Kautabletten enthalten

- Der Wirkstoff ist: Simethicon. 1 Kautablette enthält 42 mg Simethicon.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerolmonostearat SE, Aetheroleum Foeniculi, Aetheroleum Menthae piperitae, Aetheroleum Carvi, Glucose (300,03 mg), Saccharose (247,61 mg).

Wie Antiflat-Kautabletten aussehen und Inhalt der Packung

Antiflat-Kautabletten sind runde, weiße, beidseitig gewölbte Tabletten mit charakteristischem Geruch und Geschmack nach Kümmel und Fenchel.

Packungsgrößen: 30 und 50 Stück in Blisterpackung;
300 Stück im Tablettenbehältnis.

Pharmazeutischer Unternehmer

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., 8502 Lannach

Hersteller

G.L. Pharma GmbH, 8502 Lannach

Z.Nr.: 1-13124

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im November 2011.