

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Eltern!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

INFECTODELL®

Lösung zum Auftragen auf die Haut bei Dellwarzen

Zusammensetzung

1 ml INFECTODELL® enthält 50 mg Kaliumhydroxid.
Weiterer Bestandteil: gereinigtes Wasser
1 Packung enthält 2ml Lösung zum Auftragen auf die Haut sowie eine zusätzliche Verschlusskappe mit einem Plastikspatel zum Auftragen der Lösung.

WAS IST INFECTODELL UND WOZU WIRD ES ANGEWENDET?

INFECTODELL wird äußerlich bei Befall mit Dellwarzen (*Molluscum contagiosum*) angewendet (siehe auch „Wichtige Informationen zu Dellwarzen“ auf der Rückseite).

INFECTODELL führt zu einer Auflösung virusbefallener Zellen und dadurch zu einer Abwehrreaktion der Haut im Bereich der Dellwarze. Ziel der Behandlung ist eine kleinflächige, schmerzlose Entzündung. Sobald diese abheilt, kommt es auch zur Abheilung der Dellwarze.

Bitte beachten Sie: INFECTODELL ist nicht geeignet zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen (*Verrucae*). Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie bzw. Ihr Kind an Dellwarzen oder gewöhnlichen Warzen leiden, sollten Sie vor der Anwendung von INFECTODELL Ihren Arzt fragen.

WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON INFECTODELL BEACHTEN?

INFECTODELL darf nicht angewendet werden:

- in Augennähe
- auf bereits entzündeten Dellwarzen
- auf Schleimhäuten (Mund- oder Genitalbereich), offenen Wunden oder aufgekratzter Haut
- zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen, Alterswarzen, Muttermalen sowie Hühneraugen und anderen Hautverhornungen
- **bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren**
- bei bekannter Neigung zu überschießender Narbenbildung (hypertrophe Narben, Keloide)
- bei Personen mit angeborener oder erworbener Immunschwäche (z.B. HIV-Infektion bzw. Behandlung mit Medi-

WIE IST INFECTODELL ANZUWENDEN?

Wenden Sie INFECTODELL immer genau nach den Anweisungen in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung


Tragen Sie zweimal täglich mit dem Spatel eine geringe Menge INFECTODELL punktgenau auf die Dellwarzen auf und lassen Sie die Lösung eintrocknen.

So wenden Sie INFECTODELL richtig an**1. Dies müssen Sie vor der ersten Anwendung tun**

- Tauschen Sie den Deckel der Flasche gegen den beiliegenden Verschluss mit Plastikspatel aus. Spülen Sie den Originaldeckel unter fließendem Wasser ab und bewahren Sie ihn auf. Schrauben Sie den Originaldeckel wieder auf, wenn Sie INFECTODELL transportieren wollen.
- Notieren Sie das Datum der ersten Anwendung auf der Schachtel. INFECTODELL ist nach dem ersten Öffnen vier Wochen haltbar.
- Sorgen Sie bei jeder Anwendung für eine sehr gute Beleuchtung.

2. Benetzen Sie den Spatel mit INFECTODELL

- Stellen Sie INFECTODELL immer auf eine feste und ebene Unterlage außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Faltschachtel kann als Standfuß verwendet werden: Drücken Sie die Perforation ein und stellen Sie die Flasche in die entstehende Öffnung.
- Öffnen Sie den kindergesicherten Verschluss (Drücken und gleichzeitiges Drehen nach links).
- Streifen Sie den mit INFECTODELL getränkten Spatel sorgfältig an der Innenseite der Flaschenöffnung ab. Es darf kein Tropfen am Spatel zu sehen sein.



Die Lösung ist stark ätzend!
Für Kinder unzugänglich aufbewahren und bei der Anwendung außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Vorsicht bei der Anwendung, bei Fehlanwendung sind Verätzungen möglich!

INFECTODELL enthält eine Lauge (Alkali) und kann bei fehlerhafter Anwendung ätzend wirken.

Wichtige Hinweise zur sicheren Anwendung

- Halten Sie die Flasche während der Anwendung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenden Sie INFECTODELL nicht bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren an.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen! Waschen Sie nach jeder Anwendung die Hände. **Falls INFECTODELL versehentlich in das Auge gerät, spülen Sie dieses sofort 15 Minuten lang unter fließendem Wasser aus.** Suchen Sie umgehend einen Arzt auf und zeigen Sie ihm diese Gebrauchsinformation.
- Achten Sie darauf, dass die Lösung nicht auf die gesunde Haut oder auf Schleimhäute gerät, um Reizungen zu vermeiden. Lassen Sie die Lösung gut eintrocknen, um eine Verteilung auf gesunde Haut zu vermeiden. **Verschüttete Lösung auf Haut oder Schleimhäuten sofort 15 Minuten lang mit reichlich fließendem Wasser abspülen.**
- **Bei Verschlucken:** Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
- Bei Überdosierung oder zu häufiger Anwendung kann es zu einer schmerzhaften Entzündung der Haut kommen. Beachten Sie daher die Hinweise zur Anwendung.
- Bringen Sie die Lösung nicht auf Kleidung, Textilien oder Tischdecken.
- Verschüttetes INFECTODELL nehmen Sie bitte mit einem saugfähigen Papiertuch auf und waschen die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser ab.

kamenten, die das Immunsystem unterdrücken), da hierfür bisher keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von INFECTODELL ist erforderlich:

- bei Dellwarzen in der Stillzeit an der stillenden Brust. Vermeiden Sie den Kontakt des Säuglings mit der behandelten Haut.
- bei Patienten mit atopischem Ekzem (Neurodermitis). INFECTODELL sollte nicht im Akutstadium des atopischen Ekzems angewandt werden, sondern erst nach geeigneter ärztlicher Vorbehandlung.

3. Tragen Sie INFECTODELL auf die Dellwarzen auf


- Betupfen Sie alle Dellwarzen mit der flachen Seite des Spatels und lassen Sie die Lösung eintrocknen. Nach jeweils 3–5 Dellwarzen sollten Sie den Spatel erneut mit INFECTODELL benetzen.
- Schrauben Sie nach der Anwendung den Verschluss mit dem Spatel wieder auf.
- Lagern Sie INFECTODELL immer fest verschlossen, aufrecht stehend und außerhalb der Reichweite von Kindern.

**4. Wiederholen Sie die Anwendung täglich**

- Tragen Sie INFECTODELL wie in Schritt 2 und 3 beschrieben **täglich zweimal**, am besten morgens und abends, auf die Dellwarzen auf.

5. Beenden Sie die Anwendung

- Beenden Sie die Anwendung, sobald eine Entzündung die Abheilung einer Dellwarze anzeigt. Die Entzündung erkennen Sie an einer mindestens 12 Stunden anhaltenden Rötung.
- Beenden Sie die Anwendung spätestens nach 14 Tagen, auch wenn es zu keiner Entzündung kam. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt. Dieser wird über das weitere Vorgehen entscheiden.

**6. Warten Sie die Abheilung der Dellwarzen ab**

- Die Entzündung zeigt an, dass Ihr Körper die Dellwarzen bekämpft. Haben Sie nun etwas Geduld und warten Sie die Abheilung der Dellwarzen ab. INFECTODELL darf auf entzündeten Dellwarzen nicht mehr angewendet werden.



Bei Anwendung von INFECTODELL mit Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln bekannt. Tragen Sie jedoch INFECTODELL sicherheitshalber nicht zeitgleich mit einem Arzneimittel auf dieselbe Hautstelle auf.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist INFECTODELL gut verträglich. Wie alle anderen Präparate zur Behandlung von Erkrankungen kann INFECTODELL jedoch auch Nebenwirkungen haben.

Häufig:

Kurzzeitige Hautreizungen, vor allem Rötung und leichtes Brennen am Auftragsort. Diese treten unmittelbar nach Anwendung von INFECTODELL auf und klingen in der Regel nach wenigen Minuten ab. Die Stärke der Hautreizung ist abhängig von der Empfindlichkeit der Haut und der Menge der applizierten Lösung. Beachten Sie daher sorgfältig die Anwendungshinweise und tragen Sie INFECTODELL sparsam auf.

Vorübergehende Entzündungsreaktionen mit Rötung und Juckreiz im Bereich der Dellwarze. Diese sind beabsichtigt und führen zur Abheilung der Dellwarze. Dabei kann es auch zu einer Verschörfung der abheilenden Hautpartie kommen.

Gelegentlich:

Vorübergehende Verminderung oder Verstärkung der Hautpigmentierung (Hypo- bzw. Hyperpigmentierung).

Selten:

Narbenbildung. Das Risiko der Narbenbildung ist am größten, wenn die Dellwarzen zusätzlich aufgekratzt oder ausgedrückt werden.

Sollten Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, setzen Sie INFECTODELL ab und benachrichtigen Ihren Arzt. Dieser kann dann gegebenenfalls über weitere Maßnahmen entscheiden.

WIE IST INFECTODELL AUFZUBEWAHREN?

INFECTODELL unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Flasche dicht verschlossen und aufrecht stehend lagern.

Um die Flasche für den Transport dicht zu verschließen, müssen Sie den Originaldeckel (ohne Spatel) wieder aufschrauben!

Nach dem ersten Öffnen ist die Lösung 4 Wochen haltbar. Notieren Sie das Anbruchdatum auf der Faltschachtel.

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel und auf der Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie das Medizinprodukt nicht mehr nach diesem Datum.

140102-01G

Hersteller

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim
Internet: www.infectopharm.com

Stand der Information: Oktober 2012