



CICAPLAST WUNDPFLEGECREME

Darreichungsform: Creme
 Emulsionstyp: O/W Emulsion
 Inhalt: 40 ml
 PZN: 2564965

ANWENDUNGSBEREICH

3-fach-Wirkung: Regenerierend – antibakteriell – schützend.

- > Nach dermatologischen Behandlungen (z.B. Laser, Peeling, kleine chirurgische Eingriffe).
- > Für gereizte, rissige Haut.
- > Allgemein bei Beeinträchtigungen der Haut durch äußere Reizfaktoren (Kälte, Trockenheit).
- > Bei oberflächlichen Wunden.
- > Bei oberflächlichen, punktuellen Verletzungen (z.B. Mikro-Verletzungen, Verbrennungen, Kratzer ohne Bluten).
- > Bei rissigen Lippen, nach Epilation, bei Schuppenflechte.

EIGENSCHAFTEN

- > Madecassoside.
- > Kupfer-/Zink-/Mangan-Komplex.
- > Hyaluronsäure und Glycerin.
- > Ohne Duftstoffe.
- > Nicht komedogen.

ANWENDUNG

- > Falls eine Desinfektion notwendig ist, die betroffene Hautpartie zuvor mit einer milden antiseptischen Lösung säubern.
- > Je nach Indikation und Bedarf 1–3 x pro Tag auf die betroffenen Hautpartien auftragen.
- > Die Verträglichkeit von CICAPLAST ist auch auf Lippen getestet und aufgrund seiner wasserfesten Formel ebenfalls für diesen Bereich besonders geeignet.

Anwendungshinweis:

- > ACHTUNG: CICAPLAST nicht auf blutende Hautstellen auftragen.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Bei Hauterwärmung **THERMALWASSER**-Kompressen verwenden.

INCIS

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| > AQUA | > MADECASSOSIDE |
| > GLYCERIN | > DIMETHICONOL |
| > CYCLOPENTASILOXANE | > MANGANESE GLUCONATE |
| > CYCLOHEXASILOXANE | > SODIUM HYALURONATE |
| > DIMETHICONE | > DISODIUM EDTA |
| > C30-45 ALKYL DIMETHICONE | > COPPER GLUCONATE |
| > SODIUM CITRATE | > CITRIC ACID |
| > PEG/PPG-18 /18 DIMETHICONE | > POLYSORBATE 20 |
| > PANTHENOL | > METHYLPARABEN |
| > ZINC GLUCONATE | > BENZOIC ACID |