

Gebrauchsinformation:**Sanvita Dolorex Spray**

Z.Nr.: 7-00862

Zusammensetzung:

100 ml enthalten: Diäthylaminsalicylat 10 g, Menthol 5 g, Kampfer 2 g, weiters Latschenkieferöl, Isopropanol, Glycerin und Wasser.

Arzneiform: Lösung**Packungsgrößen:** 50 ml und 100 ml**Pharmazeutisch-therapeutische Kategorie und Wirkungsweise:**

Dolorex-Spray wirkt durch die Haut schmerzstillend, entzündungshemmend und abschwellend. Besonders bei akut-schmerzhaften und entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates führt die Anwendung von Dolorex-Spray zu einer Schmerzlinderung mit Rückbildung der Schwellungszustände und Verbesserung der Beweglichkeit. Dolorex-Spray klebt und schmiert nicht und trocknet die Haut nicht aus.

Zulassungsinhaber: Sanamed GesmbH, A-1230 Wien, www.sanamed.com**Hersteller:** Strallhofer Pharma GmbH, A-7011 Siegendorf**Anwendungsgebiete:**

Schmerzhafte stumpfe Sport-, Unfall- und Arbeitsverletzungen wie Quetschungen, Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Blutergüsse und Tennisarm.

Schmerzhafte entzündliche und degenerative Erkrankungen der Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder wie Muskelrheumatismus, Arthritis, Lumbago, Sehnenscheiden- und Schleimbeutelentzündung, Muskelverspannung, Nackensteife und bei Ischias.

Gegenanzeigen:

Dolorex-Spray darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Dolorex-Spray darf nicht auf offene Wunden, Hauterkrankungen (zB. Ekzem) oder auf Schleimhäute aufgebracht werden.

Nicht im Augen-, Nasen- und Mundbereich anwenden. Nicht anwenden bei Kindern unter 2 Jahren.

Schwangerschaft und Stillperiode:

Bei Langzeitbehandlung auf großen Flächen ist Vorsicht geboten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

Vorsichtig anwenden bei Kindern von 2 - 7 Jahren (kampferhaltig). Bei vorgeschädigter Niere ist für die Langzeitbehandlung auf großen Flächen Vorsicht geboten.

Der Eintritt einer Schwangerschaft ist dem Arzt zu melden.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Bei Fortbestand der Beschwerden, oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestlich eine ärztliche Beratung erforderlich.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung:

Mehrmals täglich über die schmerzenden Stellen hinaus aufsprühen und einziehen lassen. Die aufgesprühte Flüssigkeit kann auch leicht einmassiert werden.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann Dolorex-Spray Hautreizungen und Rötungen hervorrufen (Überempfindlichkeitsreaktionen), welche jedoch in der Regel nach Absetzen der Behandlung verschwinden.

Bei Auftreten hier nicht angegebener Nebenwirkungen ist der Arzt oder Apotheker zu informieren.

Verfalldatum und Lagerungshinweise:

Nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Lichtschutz erforderlich.

Nicht über Raumtemperatur (bis 25 °C) lagern.

Stand der Gebrauchsinformation: 10.11.1997

Bei Unklarheiten bitte fachliche Beratung einholen.