

Gebrauchsinformation

Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan"

Liebe Patientin! Lieber Patient!

Sie haben von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt oder Apothekerin/Apotheker die homöopathische Arzneispezialität **Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan"** empfohlen bekommen, da sie/er es als geeignetes Medikament zur Behandlung Ihrer Krankheit und Verbesserung Ihres Gesundheitszustandes erachtet. Halten Sie sich bitte genau an die Anordnung Ihrer Ärztin/Ihres Arztes oder Apothekerin/Apothekers.

Zulassungsnummer: 3-00176**Zusammensetzung****(Was ist in Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan" enthalten?)**

Eine Einzeldosis (= 7 Globuli) enthält:

0,21875 mg Apis mellifica D10

0,21875 mg Atropa belladonna D8

0,21875 mg Lachesis mutus D12

0,21875 mg Mercurius bijodatus D12

sowie Xylit, Calciumcarbonat

Arzneiform

homöopathische Arzneispezialität, Globuli

Packungsgrösse

15 g

Pharmazeutisch-therapeutische Kategorie und Wirkungsweise**(Wie wirken Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan"?)**

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie zur Anregung der Selbstheilungstendenz des Körpers.

Die Erkenntnisse über die Heilwirkung von homöopathischen Einzelmitteln, die aus Pflanzen, Tieren und Mineralien stammen, werden durch Arzneimittelprüfungen am gesunden Menschen (Prüfungssymptome), durch Anwendung am Kranken und aufgrund von Erkenntnissen naturwissenschaftlicher Arzneimittelwirkungen gewonnen. Die Zusammenfassung ergibt das Arzneimittelbild als Grundlage der homöopathischen Medizin.

Die Wirkungsweise ist bei Übereinstimmung von Krankheitsbild und Arzneimittelbild nicht so sehr an die Dosisgrösse gebunden, sondern eher an die Häufigkeit der Dosis-Wiederholung.

Das Kombinationsmittel *Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan"* ist nach dem Arzneimittelgesetz eine homöopathische Arzneispezialität und setzt sich aus homöopathischen Einzelmitteln zusammen. Kombinationsmittel entsprechen der gewohnten klinischen Verordnung nach Indikationen. Dabei werden solche homöopathische Einzelmittel gemischt, die vergleichbare oder sich ergänzende Anwendungsgebiete haben.

Die *Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan"* sind ein linderndes, heilungsförderndes Präparat bei Erkältungen mit entzündlichen Erscheinungen in Rachen, Hals, Mandeln und Bronchien.

Zulassungsinhaber

Jacoby Pharmazeutika AG, 5400 Hallein

Hersteller

SIMILASAN AG, CH-8916 Jona, Schweiz

Anwendungsgebiete**(Wann werden Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan" verwendet?)**

Zur Anregung der Selbstheilungstendenz gemäss dem homöopathischen Arzneimittelbild bei:

- Akuten und chronischen, schmerzhaften Halsentzündungen.

Gegenanzeigen

(Wann dürfen Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan" nicht angewendet werden?)

Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Präparates. Eine Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist möglich. Teilen Sie Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt jedoch mit, falls Sie schwanger sind, stillen oder eine Schwangerschaft planen.

Vorsichtsmassnahmen und besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

Charakteristischerweise kann insbesondere nach Beginn der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln eine vorübergehende Verstärkung der Krankheitszeichen auftreten. Solche Reaktionen sind harmlos.

Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung

1. Präparat nicht mehr einnehmen bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal ca. 7 Globuli einnehmen (bei Säuglingen 3 Globuli). Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter "Dosierung und Art der Anwendung" einhalten.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder, wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich. Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einer(m) homöopathisch erfahrenen Ärztin/Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome auftreten können.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Dosierung und Art der Anwendung

(Wie verwenden Sie Globuli gegen Halsweh Nr. 2 "Similasan"?)

Falls nicht anders verordnet, folgende Dosierung einhalten:

Kinder und Erwachsene: ca. 7 Globuli als Einzeldosis.

Säuglinge: 3 Globuli als Einzeldosis.

Bei akuten Beschwerden: mehrmals täglich bis stündlich.

Mit zunehmender Besserung allmählich seltener.

Zum Ausheilen: 3 mal täglich.

- Kügelchen im Mund zergehen lassen.
- Darf auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Behandlungsdauer

Die Reaktionsdauer des Organismus auf eine Arzneimittelgabe ist individuell verschieden. Wenn die Beschwerden abgeklungen sind, soll die Arzneieinnahme beendet werden. Bei neuerlichem Auftreten von Beschwerden kann die Arznei wieder eingenommen werden. Kommt es dann nicht bald zu einer Besserung, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Wenn Sie glauben, das Medikament wirke zu stark oder zu schwach, so sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis auf Verfalldatum und Lagerung

Das auf der Verpackung angegebene Verfalldatum beachten.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Nicht über 25 °C lagern.

Lichtschutz erforderlich, Arzneimittel daher in der Aussenverpackung aufbewahren.

Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde).

Stand der Gebrauchsinformation

Juli 2001

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.