Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Teufelskralle STADA® 480 mg



Wirkstoff: Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 Filmtablette enthält: 480 mg Trockenextrakt aus Teufelskrallenwurzel (4,4-5,0:1). Auszugsmittel: Ethanol 60% (V/V).

Sonstige Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Macrogol 6000, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Titandioxid (E171).

Hinweis:
1 Filmtablette enthält ca. 0,23 g Lactose (ca. 0,2 g Kohlenhydrate).

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 20 (N1), 50 (N2), 100 (N3) Filmtabletten

Stoff- oder Indikationsgruppe:
Pflanzliches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates.

Pharmazeutischer Unternehmer:
STADA GmbH
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101 603-0
Telefax: 06101 603-259
Internet: http://www.stada.de

Hersteller:
STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Therapie bei Verschleißerscheinungen des Bewegungsapparates.

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Teufelskralle STADA® 480 mg nicht anwenden?
- bei Überempfindlichkeit gegen Teufelskralle oder einen der sonstigen Bestandteile von Teufelskralle STADA® 480 mg
- bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und ist daher ungeeignet für Personen mit Galaktose-Unverträglichkeit (hereditäre Galaktose-Intoleranz), Laktose-Intoleranz durch Laktase-Insuffizienz und Glukose-Galaktose-Malabsorption.

Wann dürfen Sie Teufelskralle STADA® 480 mg erst anwenden, wenn Sie mit Ihrem Arzt darüber gesprochen haben?
Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Teufelskralle STADA® 480 mg nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Dies gilt auch, wenn die folgenden Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Gallensteinleiden ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Was ist in der Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?
Zur Anwendung dieses Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Teufelskralle STADA® 480 mg sollte deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
Für die Anwendung von Teufelskralle bei Kindern liegt kein Erkenntnismaterial vor. Teufelskralle STADA® 480 mg sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Teufelskralle STADA® 480 mg nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Teufelskralle STADA® 480 mg sonst nicht richtig wirken kann.

In welcher Dosierung und wie oft sollen Sie Teufelskralle STADA® 480 mg einnehmen?
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen 2-mal täglich 1 Filmtablette ein.

Wie und wann sollen Sie Teufelskralle STADA® 480 mg einnehmen?
Nehmen Sie die Filmtabletten morgens und abends zu den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit ein.

Wie lange sollen Sie Teufelskralle STADA® 480 mg einnehmen?
Teufelskralle STADA® 480 mg soll bis zum Eintritt der Beschwerdefreiheit eingenommen werden. Bitte beachten Sie jedoch die Angaben unter „Anwendungsgebiete".

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was kann passieren, wenn Teufelskralle STADA® 480 mg in größeren Mengen angewendet wurde (beabsichtigt oder versehentlich)?
Bei erheblicher Überdosierung kann es bei Personen mit Milchzucker-Unverträglichkeit (Laktose-Intoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen

In seltenen Fällen sind Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerzen beobachtet worden.

Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, Nesselsucht, Gesichtsödeme bis hin zum Kreislaufzusammenbruch (anaphylaktischer Schock) beschrieben worden.

Sehr selten wurde bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus ein Blutzuckeranstieg beobachtet, der nach Absetzen zurückging.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung aufgedruckt.
Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Teufelskralle STADA® 480 mg aufzubewahren?
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information:

1. Mai 2004

9209071 0405 40008292-03

STADA