

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray

Wirkstoffe: Dexpanthenol, Salbeitrockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray beachten?
3. Wie ist Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray enthält als Wirkstoffe einen wässrigen Auszug aus Salbeiblättern und Dexpanthenol. Das ätherische Salbeiöl wirkt desinfizierend, die Gerbstoffe der Salbeiblätter wirken reizmildernd, lokal entzündungshemmend und leicht lokalanästhetisch. Dexpanthenol wird in den Zellen rasch in Pantothenensäure umgewandelt. Pantothenensäure ist unentbehrlich für den Aufbau und die Regeneration der Epithelien der Schleimhaut. Deshalb fördert Dexpanthenol die Wundheilung, erhöht die Infektabwehr der Schleimhaut und unterstützt so die Wirkung des Salbeiextraktes.

Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray ist ein traditionell pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei lokalen Schleimhautreizungen in der Mundhöhle, Prothesendruckstellen und kleinräumigen Entzündungen des Zahnfleisches.

Die Anwendung dieses traditionell pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray BEACHTEN?

Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Salbei, Dexpanthenol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray anwenden.

Nicht in Augen oder Nase sprühen.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren wird nicht empfohlen, da eine medizinische Beratung in Anspruch genommen werden sollte.

Anwendung von Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray enthält Proplylenglykol und kann daher Hautreizungen hervorrufen.

3. WIE IST Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.


Dosierung

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren: Mehrmals täglich direkt auf die schmerzenden Stellen sprühen.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren wird nicht empfohlen, da eine medizinische Beratung in Anspruch genommen werden sollte.

Art der Anwendung

- Richten Sie die drehbare Kanüle auf der Sprühpumpe im rechten Winkel zur Flasche auf (siehe Skizze).
- Sie können jetzt den Sprühkopf auf die gewünschte Anwendungsstelle im Mund richten. Durch die Kanüle an der Sprühpumpe können Sie auch schwer zugängliche Stellen (wie z.B. Zahntaschen) gut erreichen.
- Sprühen Sie Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray durch mehrmaliges Drücken direkt auf die schmerzenden Stellen.
- Verschließen Sie die Sprühpumpe nach jeder Anwendung wieder durch Zurückdrehen der Kanüle (siehe Skizze).



Dauer der Anwendung

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Österreich

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verw. bis;“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie dieses Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray enthält

Die Wirkstoffe sind: Dexpanthenol und Salbeitrockenextrakt

1 g Lösung enthält:

Dexpanthenol	50 mg
Salbeitrockenextrakt (5-6:1)	10 mg
Extraktionsmittel Wasser	

Die sonstigen Bestandteile sind: Saccharin-Natrium, äther. Pfefferminzöl, Hydroxypropylcellulose, 200 mg Propylenglykol, gereinigtes Wasser.

Wie Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray aussieht und Inhalt der Packung

Veralgin Mund & Zahnfleisch Spray ist eine braune Lösung und in Braunglasflaschen zu 15 ml (ausreichend für mindestens 100 Anwendungen) mit Sprühpumpe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Kwizda Pharma GmbH, 1160Wien

REGNr: HERB-00044

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2014