

Gebrauchsanweisung

voice-angin®

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, denn sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Produkts beachten sollten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

- 1. Was ist das Anwendungsgebiet von voice-angin®?**
- 2. Was ist in voice-angin® enthalten?**
- 3. Was müssen Sie vor der Einnahme von voice-angin® beachten?**
- 4. Wie ist voice-angin® anzuwenden?**
- 5. Was ist zu tun, wenn voice-angin® in großen Mengen angewendet wurde?**
- 6. Wie ist voice-angin® aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?**
- 7. Weitere Informationen**

1. Was ist das Anwendungsgebiet von voice-angin®?

voice-angin® Lutschtabletten werden bei Heiserkeit, Halskratzen und trockenem Rachenraum angewendet. voice-angin® bildet einen Schutzfilm, welcher die Symptome einer Heiserkeit lindert und als körperlich-physikalische Barriere gegenüber Erregern wirkt.

Der Schutzfilm von voice-angin® hilft beispielsweise bei:

- übermäßiger Beanspruchung der Stimme (z.B. Vorträge oder Gesang)
- trockener Luft (z.B. durch Heizung oder Klimaanlage)
- Reisen in klimatisierten Fahrzeugen (z.B. Auto, Bus, Bahn, Flugzeug)
- während der Erkältungszeit
- während der Allergiezeit zum Schutz vor Pollen (z.B. Heuschnupfen)
- bei starkem Rauchen

Der Schutzfilm von voice-angin® schützt vor externen /exogenen Erregern.

2. Was ist in voice-angin® enthalten?

voice-angin® Lutschtabletten enthalten: Carbopol, Polyhexanidhydrochlorid, Carrageen, Natriumhyaluronat, Mannitol, Natriumhydrogencarbonat, Citronensäure, Macrogol, Sucralose, Kirsch-Aroma, Levomenthol, Kaliummonohydrogenphosphat, Zinkstearat, Siliciumdioxid, Sorbitol, Xanthan, Menthylsalicylat.

3. Was müssen Sie vor der Einnahme von voice-angin® beachten?

voice-angin® darf nicht eingenommen werden

- bei Überempfindlichkeit gegen einen der enthaltenen Inhaltsstoffe

voice-angin® enthält Mannitol, Sucralose und Sorbit. Wenn Sie unter Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Zuckern leiden, wenden Sie die voice-angin® Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an.

Bitte voice-angin® Lutschtabletten nicht im Liegen lutschen, z. B. beim Einschlafen, da sonst

die Gefahr des Verschluckens besteht.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen eine Anwendung von voice-angin® Lutschtabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher keine bekannt.

Darreichungsform und Inhalt:

20 Lutschtabletten

4. Wie ist voice-angin® anzuwenden?

Verwenden Sie die voice-angin® Lutschtabletten gemäß den Anwendungshinweisen in dieser Gebrauchsanweisung wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Erwachsene ab 18 Jahren

Mehrmals täglich, bis zu 6 Tabletten pro Tag.

Kinder und Jugendliche von 6 -18 Jahren

Mehrmals täglich, bis zu 3 Tabletten pro Tag.

Wir empfehlen die Einnahme nach dem Essen und Trinken.

Bitte lutschen Sie voice-angin® langsam bis die Lutschtablette vollständig aufgelöst ist, damit sich die Wirkung vollständig entfalten kann. Bitte schlucken Sie die Tabletten nicht im Ganzen hinunter und zerbeißen Sie diese nicht.

Regelmäßige und präventive Anwendung

Die regelmäßige und ordnungsgemäße Anwendung der voice-angin® Lutschtabletten ist für die Wirkung von entscheidender Bedeutung. Lutschen Sie voice-angin® präventiv, wenn Sie wissen, dass Ihre Stimme stark beansprucht wird, beispielsweise bei langen Vorträgen und beim Gesang.

Dauer der Anwendung

Bei Bedarf kann voice-angin® über einen längeren Zeitraum (z.B. Allergiezeit oder Erkältungszeit) angewendet werden. Sollten akute Beschwerden länger als 2-3 Tage bestehen, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

5. Was ist zu tun, wenn voice-angin® in großen Mengen angewendet wurde?

Wenn Sie größere Mengen von voice-angin® eingenommen haben als Sie sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

voice-angin® enthalten Süßungsmittel, welche bei übermäßigem Verzehr abführend wirken können. Gegenmaßnahmen sind in diesem Fall nicht erforderlich

6. Wie ist voice-angin® aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?

Das Haltbarkeitsdatum von voice-angin® ist auf der Verpackung abgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen die voice-angin® Lutschtabletten nicht mehr angewendet werden.

Bitte verschließen Sie nach jeder Einnahme das Röhrchen wieder sorgfältig.
voice-angin® Lutschtabletten sind trocken und nicht über 25°C zu lagern.

7. Weitere Informationen


Bitte bewahren Sie das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf!

Packungsgrößen

20 Lutschtabletten

Stand der Information


Oktober 2015

 Apothekenexklusives Medizinprodukt



Hersteller:

MPC International S. A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg



Vertrieb:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH
Doerenkampgasse 11
1100 Wien

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH:

Tel: +43 (0) 1 688 21 61 -0

Fax: +43 (0) 1 688 21 61 -27

E-Mail: office@klosterfrau.at

Internet: www.voice-angin.at

Eine starke Stimme und einen gesunden Hals wünscht Ihnen voice-angin®!