

PZN (Deutschland)	10206211
PZN (Österreich)	4180536
Interne Artikelnummer	370
Produkt Name	<b>amitamin® M forte</b>
Verkehrsbezeichnung	ergänzende bilanzierte Diät zur diätetischen Behandlung von gestörten Gefäß- und Zellfunktionen bei erektiler Dysfunktion.
Nährwertangaben je Portion	je Tagesportion (6 Kapseln): Energie: 12,9 kcal / 54 kJ; Fett: < 0,01 g (davon gesättigte Fettsäuren: < 0,01 g); Kohlenhydrate: 0,22 g (davon Zucker: 0,14 g); Eiweiß: 3,00 g; Salz: < 0,01 g.
Nährwertangaben je 100 g	Je 100 g: Energie: 251 kcal / 1055 kJ; Fett: < 0,1 g (davon gesättigte Fettsäuren: < 0,1 g); Kohlenhydrate: 4,2 g (davon Zucker: 2,8 g); Eiweiß: 58,4 g; Salz: < 0,1 g.
Wirksame Bestandteile	Siehe grafische Tabelle auf <a href="http://www.amitamin.com/shop/m-forte.html">http://www.amitamin.com/shop/m-forte.html</a>
Zutatenliste	L-Arginin Hydrochlorid, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Betain Hydrochlorid, Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat, Trägerstoff Siliciumdioxid), Zinkgluconat, Piniennrindenextrakt, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Maltodextrin, Pyridoxin Hydrochlorid, Colecalciferol, Folsäure, Cyanocobalamin.
Tagesverzehrsempfehlung	Täglich sechs Kapseln, bevorzugt morgens und abends jeweils drei Kapseln, vor dem Essen mit reichlich Wasser zu sich nehmen.
Warn- und Gebrauchshinweise	<p>Die angegebene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geeignet.</p> <p>Nur für Erwachsene geeignet. amitamin® M forte darf nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Es ergänzt, aber ersetzt ärztliche Maßnahmen nicht. Es ist kein vollständiges Lebensmittel, sondern eine ergänzende bilanzierte Diät. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Die auf der Verpackung angegebene Haltbarkeit gilt nur für das unbeschädigte und den Hinweisen entsprechend gelagerte Produkt.</p> <p><b>Gegenanzeigen</b></p> <p>Grundsätzlich ist amitamin® M forte zur dauerhaften Einnahme bestimmt und sehr gut verträglich. Bei Neigungen zu Fieberbläschen, akutem Herpes-simplex oder Infektionen sollten Sie Ihren Arzt darauf aufmerksam machen.</p> <p>Bei der gleichzeitigen Einnahme von amitamin® M forte und Medikamenten zur Behandlung erektiler Dysfunktion ("Potenzmittel"), speziell bei der Einnahme von PDE-5 Hemmern (also die Wirkstoffe <b>Sildenafil</b>, <b>Tadalafil</b> bzw. <b>Vardenafil</b>, bekannter z.B. unter den Marken <b>Viagra®</b>, <b>Cialis®</b> oder <b>Levitra®</b>) wird sich die Wirkung des Medikamentes vermutlich (erheblich) verstärken. Ähnliches gilt für Medikamente, die für die Regulierung des Blutdruckes bestimmt sind. Auch dann könnte sich die Wirkung des Arzneimittels und von amitamin® M forte verändern, vermutlich verstärken.</p> <p>Bitte besprechen Sie daher eine kombinierte Einnahme dieser verschreibungspflichtigen Potenzmittel oder anderer Medikamente und amitamin® M forte daher unbedingt vorher mit Ihrem behandelnden Arzt.</p>