

Diabet-orthim®

Nahrungsergänzungsmittel

Trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei

Diabet-orthim® enthält Pflanzenauszüge aus Bittermelone, Curcuma, Ceylon-Zimt und Ingwer plus Chrom (III). Die Auszüge plus Chrom (III) beeinflussen die Nüchternblutzuckerwerte, die Insulinverwertung und die Glucoseverwertung der Muskelzellen (zahlreich in diversen Studien beschrieben).

Praktische Nahrungsergänzung:

Wichtige Aspekte sprechen dafür, Bittermelone und die anderen Pflanzeninhaltsstoffe in konzentrierter Kapselform statt z.B. als zubereitetes Gemüse oder als Gewürz zu sich zu nehmen: Um dieselbe Menge an Inhalts- und Nährstoffen zuzuführen wie mit Diabet-orthim, müsste man täglich große Mengen an Gemüse und Gewürzen verzehren. Das ist unpraktisch und im Alltag kaum durchführbar.

Viele Faktoren können den Zuckerstoffwechsel beeinflussen:

- Genetisches Risiko
- Metabolisches Syndrom (u. a. Kombination aus Übergewicht, erhöhtem Blutdruck, erhöhten Blutfettwerten und Zuckerstoffwechselstörung)
- Übergewicht
- Bewegungsmangel
- Höheres Lebensalter
- Stress
- Kohlenhydratreiche Ernährung
- Rauchen
- Hohe Arbeitsbelastung

Darreichungsform, Packungsgröße und PZN:

60 Kapseln \triangleq 63,00g PZN 10308934

120 Kapseln \triangleq 63,00g PZN 10308940

Verzehrempfehlung:

2 x täglich 1 Kapsel zu den Mahlzeiten schlucken

Zutaten pro Kapsel:

Bittermelonen-Extrakt, Kapselhüllsubstanz: Hydroxypropylmethylcellulose, Füllstoff: Cellulose (mikrokristallin), Ceylon-Zimtrinde, Curcuma-Wurzelstock, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Ingwer-Wurzelstock, Füllstoff: Calciumcarbonat, Farbstoffe: Titanoxid und Chlorophyllin, Chrom (III)-chlorid

200 mg Bittermelone

50 mg Curcuma

50 mg Ceylon-Zimt

20 mg Ingwer

50 µg Chrom

Wichtige Hinweise:

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kinder unter 12 Jahren und Schwangere oder stillende Mütter sollten dieses Produkt nicht nehmen, außer nach Rücksprache mit dem Arzt. Das Produkt kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.