

**Gebrauchsinformation:**
Information für den Anwender

Dimeticon-CT 85 mg Kautabletten



Wirkstoff: Dimeticon-1000-Siliciumdioxid (94:6); syn.: Simeticon

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dimeticon-CT 85 mg jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Dimeticon-CT 85 mg und wofür wird es angewendet?**2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Dimeticon-CT 85 mg beachten?****3. Wie ist Dimeticon-CT 85 mg einzunehmen?****4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?****5. Wie ist Dimeticon-CT 85 mg aufzubewahren?****6. Weitere Informationen****1. Was ist Dimeticon-CT 85 mg und wofür wird es angewendet?**

Dimeticon-CT 85 mg ist ein Mittel gegen Blähungen.

Dimeticon-CT 85 mg wird angewendet

- bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus, Flatulenz, Aerophagie, Roemheld-Syndrom)
- vor diagnostischen Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten im Röntgenbild
- bei verstärkter Gasbildung nach Operationen

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Dimeticon-CT 85 mg beachten?



Dimeticon-CT 85 mg darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Dimeticon oder einen der sonstigen Bestandteile von Dimeticon-CT 85 mg sind

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Dimeticon-CT 85 mg ist erforderlich

Bei neu aufgetretenen und/oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine unter Umständen zugrunde liegende behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

Bei Einnahme von Dimeticon-CT 85 mg mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Dimeticon-CT 85 mg darf auch in der Schwangerschaft und Stillzeit angewandt werden. Der Wirkstoff wird vom Körper nicht aus dem Magen-Darm-Trakt aufgenommen, sondern unverändert wieder ausgeschieden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Dimeticon-CT 85 mg

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und Sorbitol. Bitte nehmen Sie Dimeticon-CT 85 mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Dimeticon-CT 85 mg einzunehmen?

Nehmen Sie Dimeticon-CT 85 mg immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Soweit nicht anders verordnet, werden 1 bis 2 Kautabletten zu oder nach den Mahlzeiten zerkaut eingenommen.

Bei Bedarf können auch vor dem Schlafengehen noch 1 bis 2 Kautabletten zerkaut eingenommen werden.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. Dimeticon-CT 85 mg kann, falls erforderlich, über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Dimeticon-CT 85 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Dimeticon-CT 85 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Überdosierungserscheinungen nach Einnahme von Dimeticon-CT 85 mg sind nicht bekannt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Dimeticon-CT 85 mg bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Dimeticon-CT 85 mg aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und den Blisterverpackungen angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

6. Weitere Informationen**Was Dimeticon-CT 85 mg enthält**

Der Wirkstoff ist Dimeticon-1000-Siliciumdioxid (94:6); syn.: Simeticon.

Jede Kautablette enthält 85 mg Dimeticon-1000-Siliciumdioxid (94:6).

Die sonstigen Bestandteile sind: Sorbitol, Cellulosepulver, Lactose-Monohydrat, Calciumhydrogenphosphat, Talkum, Pfefferminzaroma, Saccharin-Natrium.

Wie Dimeticon-CT 85 mg aussieht und Inhalt der Packung

Weiß, runde Tablette mit einseitiger Bruchkerbe. Dimeticon-CT 85 mg ist in Packungen mit 20, 50 und 100 Kautabletten erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer
AbZ-Pharma GmbH**

Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

Hersteller

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im

Oktober 2013
Versionscode: Z06