

## TASECTAN GEBRAUCHSINFORMATION

Tasectan ist ein Medizinprodukt, das die physiologische Funktion der Darmwand wiederherstellt. Es wurde speziell entwickelt, um die Symptome (wie Druckgefühl, häufiger Stuhlgang) unterschiedlicher Durchfallarten zu bekämpfen und zu mindern. Tasectan wirkt innerhalb von 12 Stunden.

Das Gelatinetannat, aus dem sich das Medizinprodukt zusammensetzt, wird im Magen nicht verändert und wirkt, indem es eine Schicht bildet, die die Darmschleimhaut schützt, und die Häufigkeiten und Dauer der Durchfälle reduziert. Das Medizinprodukt ist in Form von Kapseln für Erwachsene und in Form von Pulver für Kinder erhältlich.

### Art und Inhalt der Packung

- 20 Beutel zu je 250 mg (zur Anwendung bei Kindern)
- Blisterpackung mit 15 Kapseln zu je 500 mg

### Zusammensetzung

Kapseln: Gelatinetannat, Maisstärke, Magnesiumstearat

Pulver zur Anwendung bei Kindern: Gelatinetannat

### Gebrauchsanweisung

Kapseln: Kapsel mit reichlich Wasser schlucken.

Pulver: Das Pulver kann der Mahlzeit zugegeben werden, oder mit etwas Milch, Fruchtsaft oder Wasser vermischt werden. Gut verrühren und sofort verabreichen.

### Dosierung

Erwachsene: 1 bis 2 Kapseln alle 4 bis 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Kinder unter 3 Jahren: 1 Beutel alle 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Kinder zwischen 3 und 14 Jahren: 1 oder 2 Beutel alle 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

### Warnhinweise

Beachten Sie folgende Warnhinweise:

- Es ist nicht erforderlich, vor der Anwendung des Medizinprodukts einen Arzt zu konsultieren. Im Falle von heftigeren oder anhaltenden Symptomen oder wenn Zweifel bzgl. der Diagnose bestehen (hauptsächlich bei Kindern unter 3 Jahren und älteren Menschen), sollte ein Arzt konsultiert werden.
- Im Falle von Durchfall bei Kindern unter 3 Jahren und vor allem bei Vorhandensein von weiteren Symptomen empfehlen wir, einen Arzt aufzusuchen.
- Es wird empfohlen reichlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sowie die bei Durchfallerkrankungen üblichen diätischen Maßnahmen anzuwenden (orale Rehydratation).
- Zwar sind keine Nebenwirkungen bekannt, doch sollte das Medizinprodukt nicht in der Schwangerschaft oder in den ersten Monaten des Stillens angewendet werden. Auf jeden Fall sollten Sie vor der Anwendung stets Ihren Arzt konsultieren.
- Das Medizinprodukt nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
- Das Medizinprodukt nicht verwenden, wenn die Blisterpackung oder die Beutel geöffnet oder beschädigt sind.
- Bei Raumtemperatur lagern, von Wärmequellen fernhalten. Nicht einfrieren.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Gegenanzeigen und unerwünschte Wirkungen

Tasectan sollte nicht von Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Gelatinetannat oder einen der anderen Inhaltsstoffe des Medizinproduktes eingenommen werden.

Rev:04-b dated 05/02/2013

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.,  
Salzbergstraße 96, A-6067 Absam/Tirol,  
Tel: +43 5223 57926, [www.montavit.com](http://www.montavit.com)